

Dorithricin®

таблетки от боли в горле «Лесная ягода»



Инструкция по применению: Информация для пользователей

Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» 0,5 мг / 1,0 мг / 1,5 мг, сосательные таблетки

Действующие вещества: тиротрицин / бензалкония хлорид / бензокаин

Внимательно прочтите всю инструкцию по применению, прежде чем начать применение данного лекарственного средства, поскольку в ней содержится важная информация.

Применяйте данный лекарственный препарат всегда в соответствии с рекомендациями, содержащимися в данной инструкции по применению, или в строгом соответствии с предписаниями Вашего врача или фармацевта.

- Сохраните инструкцию по применению. Возможно, Вам захочется позже прочитать ее еще раз.
- Обратитесь к Вашему фармацевту, если Вам понадобится дальнейшая информация или совет.
- Если Вы обнаружите побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также тех побочных эффектов, которые не указаны в данной инструкции по применению. См. раздел 4.
- Если через 2 дня Вы не заметите улучшений или даже почувствуете себя хуже, обратитесь к своему врачу.

Что содержится в данной инструкции по применению

1. Что представляют собой Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода», и с какой целью они применяются?
2. На что следует обратить внимание перед приемом Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода»?
3. Как следует принимать Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода»?
4. Какие побочные эффекты могут наблюдаться?
5. Как следует хранить Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода»?
6. Содержимое упаковки и дальнейшая информация

1. Что представляют собой Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода», и с какой целью они применяются?

Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» представляют собой лекарственное средство для лечения полости рта и глотки.

Показания к применению

Для симптоматического лечения инфекций полости рта и глотки, сопровождающихся болью в горле и затрудненным глотанием.

2. На что следует обратить внимание перед приемом Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода»?

Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» нельзя принимать

- если у Вас имеется аллергия на тиротрицин, бензалкония хлорид, бензокаин или на одно из вспомогательных веществ, содержащихся в Dorithricin® таблетках от боли в горле «Лесная ягода» и перечисленных в разделе 6.

Предостережения и меры предосторожности

При тяжелых ангинах или боли в горле, сопровождающейся высокой температурой, головной болью, тошнотой или рвотой, следует обратиться за консультацией к врачу.

В особенности при гнойных воспалениях миндалин с высокой температурой врач решает, можете ли Вы применять Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» наряду с другими видами лечения, например, вместе с приемом антибиотиков.

При наличии свежих ран в полости рта и глотки следует отказаться от приема Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода».

Пациентам со склонностью к реакциям повышенной чувствительности кожи (аллергической контактной экземой) следует избегать приема Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода», так как возможны реакции повышенной чувствительности.

Дети

Поскольку невозможно гарантировать соответствующий способ применения (сосание) у младенцев и маленьких детей, Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» непригодны для применения у младенцев и маленьких детей (до 24 месяцев).

При применении у детей следует обращать внимание на то, чтобы у них уже был развит навык контролируемого сосания.

Прием Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода» вместе с другими лекарственными средствами:

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете другие лекарственные средства, недавно принимали другие лекарственные средства или собираетесь принимать другие лекарственные средства.

При использовании согласно предписанию никаких взаимодействий с другими лекарственными средствами до сих пор отмечено не было.

Беременность и кормление грудью

До сих пор не было выявлено каких-либо вредных воздействий на плод со стороны Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода». Однако из соображений предосторожности их прием во время беременности и грудного вскармливания должен производиться только после консультации с Вашим врачом или фармацевтом.

Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» содержат сорбитол

Принимайте Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» только после консультации со своим врачом, если Вам известно, что Вы страдаете непереносимостью определенных видов сахара.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода».

Информация для диабетиков

1 таблетка для сосания содержит 0,86 г сорбитола (источник 0,22 г фруктозы) и соответствует прим. 0,07 хлебных единиц (ХЕ). Сорбитол может оказывать легкое слабительное действие.

3. Как следует принимать Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода»?

Принимайте данное лекарственное средство всегда в строгом соответствии с тем, как это указано в данной инструкции по применению или согласно рекомендациям Вашего врача или фармацевта. Обратитесь за консультацией к своему врачу или фармацевту, если у Вас есть какие-либо сомнения.

Рекомендованная доза составляет

По необходимости медленно рассасывайте 1 -2 таблетки для сосания несколько раз в день, каждые 2 - 3 часа.

После улучшения самочувствия лечение следует продолжать в течение еще одного дня.

Если Вы приняли большее количество Dorithricin® таблеток от боли в горле «Лесная ягода», чем следует

При правильном применении отравление Dorithricin® таблетками от боли в горле «Лесная ягода» невозможно и до сих пор не наблюдалось.

После приема очень большого количества таблеток могут возникнуть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, а также, в особенности у детей, повышенное содержание метгемоглобина в крови. Возможными признаками этого являются одышка и синюшность губ и пальцев рук.

При подозрении на значительную передозировку проинформируйте об этом врача.

В качестве ответных мер рекомендуется прием достаточного количества воды и таблеток активированного угля, а также при необходимости принятие врачом соответствующих мер против метгемоглобинемии.

Если Вы забыли принять Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода»

Не принимайте двойную дозу препарата, если Вы пропустили предыдущий прием.

Сразу пососите 1 таблетку Dorithricin® от боли в горле «Лесная ягода» и далее продолжайте прием в обычной дозировке.

4. Какие побочные эффекты могут наблюдаться?

Как все лекарственные препараты данное лекарственное средство также может иметь побочные эффекты, которые, однако, не обязательно должны проявиться у каждого пациента.

При оценке частоты возникновения побочных эффектов за основу брались следующие показатели:

- Очень часто: более чем 1 пациент из 10
- Часто: от 1 до 10 пациентов из 100



- Иногда: от 1 до 10 пациентов из 1.000
- Редко: от 1 до 10 пациентов из 10.000
- Очень редко: менее чем 1 пациент из 10.000
- Неизвестно: Частоту невозможно оценить на основе имеющихся данных

Возможные побочные эффекты

Редко:

В редких случаях возможны реакции повышенной чувствительности, в особенности на продукт распада бензокаина (эфир аминобензойной кислоты).

При наружном применении, в особенности у детей и при нанесении на большие раневые поверхности, отмечалось повышенное содержание метгемоглобина в крови. Возможными признаками этого являются одышка и синюшность губ и пальцев рук.

Частота неизвестна:

У чувствительных пациентов могут также возникать аллергические реакции на вещества, которые находятся в химическом родстве с бензокаином, такие как, например, пенициллины, сульфаниламиды, косметические средства для защиты от солнца, п-аминосалициловую кислоту (парагрупповая сенсбилизация).

Сообщение о побочных эффектах

Если Вы заметите побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также и тех побочных эффектов, которые не указаны в данной инструкции по применению. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую, используя бланк для сообщений о нежелательных воздействиях лекарственных препаратов (Meldebogen für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)) (<http://www.bfarm.de>).

Ваши сообщения о побочных эффектах будут способствовать сбору дополнительной информации о безопасности данного лекарственного средства.

5. Как следует хранить Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода»?

Храните данное лекарственное средство в месте, недоступном для детей.

Нельзя использовать данное лекарственное средство после истечения срока годности – даты «Verwendbar bis:», указанной на картонной коробке и упаковке. Дата окончания срока годности – последний день указанного месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте лекарственные средства в сточные воды или бытовые отходы. Спросите у Вашего фармацевта, как следует утилизировать лекарственное средство, если Вы его больше не используете. Тем самым Вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дальнейшая информация

Что содержится в Dorithricin® таблетках от боли в горле «Лесная ягода»

- Действующими веществами являются:
1 таблетка для сосания:
Тиротрицин 0,5 мг
Бензалкония хлорид 1,0 мг
Бензокаин 1,5 мг
- Вспомогательными веществами являются:
Сорбитол (Ph. Eur.), тальк, сахарозы стеарат тип III, сахаринат натрия 2 H₂O, ароматизатор, повидон (K 25), кармеллоза натрия (Ph. Eur.)

Как выглядят Dorithricin® таблетки от боли в горле «Лесная ягода» и содержимое упаковки

Круглые таблетки розового цвета

Упаковки с 20 таблетками для сосания и 40 таблетками для сосания

Держатель регистрационного удостоверения

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Телефон: (02371) 152790

Факс: (02371) 937-329

е-мейл: info@medice-pharma.de



Производитель и со-дистрибьютор

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Факс: +49 (0)2371 937-0

Telefax: +49 (0)2371 937-329

е-мейл: info@medice.de

www.medice.de

Данная инструкция по применению была переработана в последний раз в мае 2015.

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша.